

# Emtricitabina, Fumarato de disoproxilo de tenofovir



**Marca comercial:** Truvada

**Clase de medicamento:** Inhibidor de la transcriptasa inversa análogo de los nucleósidos

Truvada contiene dos antirretrovirales: emtricitabina (Emtriva) y fumarato de disoproxilo de tenofovir (Viread). Ambos son inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos (NRTI). Los NRTI bloquean la transcriptasa inversa, una proteína que necesita el VIH para multiplicarse.

## Formas de empleo para el tratamiento del VIH/SIDA

La emtricitabina y el fumarato de disoproxilo de tenofovir han sido autorizados individualmente por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para el tratamiento de la infección por el VIH en adultos y niños. Puesto que estos dos medicamentos se recetan juntos con frecuencia, el fabricante los ha combinado en una tableta que permite administrar una dosis una vez al día. Truvada fue autorizada por la FDA el 2 de agosto de 2004 como formulación para uso conjunto con otros antirretrovirales para el tratamiento de la infección por el VIH-1 en adultos. Este medicamento no cura ni previene la infección por el VIH ni el SIDA ni reduce el riesgo de transmisión del virus a otras personas.

## Presentación/Administración

Se fabrica en tableta de administración oral.

La dosis recomendada es una tableta una vez al día. Algunos pacientes, por ejemplo, los que tienen deterioro de la función renal, pueden necesitar una dosis diferente de este producto.

## Contraindicaciones

Las advertencias y los efectos secundarios de Truvada pueden ser similares a los de ambos medicamentos administrados por separado. (Para más información véanse los resúmenes particulares de emtricitabina y fumarato de disoproxilo de tenofovir.) Los pacientes con enfermedad renal avanzada no deben tomar Truvada. Los pacientes deben informar al médico sobre cualquier problema de salud que tengan antes de tomar este medicamento.

## Posibles efectos secundarios

Al igual que otros NRTI, los medicamentos empleados para fabricar Truvada pueden causar a veces casos mortales de acidosis láctica y enfermedad del hígado, así como trastornos sanguíneos o debilidad muscular. Hay que informar al médico si una persona que tome este medicamento presenta afecciones del aparato digestivo, dolor y debilidad de las articulaciones o los músculos, dolor u hormigueo de las manos o los pies, dolor de cabeza, mareo y cansancio poco común.

Junto con sus efectos deseables, Truvada puede causar algunos efectos indeseables. Los efectos secundarios graves de este medicamento comprenden insuficiencia renal, enfermedad pancreática grave, náusea, vómito, dolor abdominal, inapetencia o adelgazamiento, sensación general de malestar, dolor o calambres musculares, dificultad respiratoria, somnolencia y cansancio o debilidad poco comunes. Las personas deben informar al médico si tienen síntomas de cualquiera de estos efectos secundarios.

Otros efectos secundarios pueden ser leves y disminuir o desaparecer con el uso continuo del medicamento. Entre los efectos menos graves de este medicamento cabe citar malestar abdominal, diarrea, mareo, gas intestinal, náusea, dolor de cabeza, erupción cutánea y cambio de color de la piel. Las personas deben informar al médico si esos efectos continúan o son molestos.

## Interacción con otros medicamentos y la comida

Es preciso avisar al médico sobre cualquier otro medicamento que tome el paciente, ya sea recetado, de venta libre o natural (a base de hierbas).

## Ensayos clínicos que usan o han usado este medicamento

Para obtener información en español acerca de ensayos clínicos que estudian emtricitabina, fumarato de disoproxilo de tenofovir, visite el sitio web de AIDSinfo: <http://www.aidsinfo.nih.gov/ClinicalTrials> y haga clic en el enlace azul en español al inicio de la página. En la casilla de búsqueda, escriba emtricitabina, fumarato de disoproxilo de tenofovir. Esta búsqueda está limitada a ciertos ensayos clínicos patrocinados por el gobierno y traducidos al español.

Para hacer una búsqueda más completa de ensayos clínicos para el tratamiento del VIH/SIDA, visite el sitio web de [clinicaltrials.gov](http://www.clinicaltrials.gov) en <http://www.clinicaltrials.gov> para utilizar una base de datos de ensayos clínicos en inglés. En la casilla de búsqueda, escriba Emtricitabine/Tenofovir disoproxil fumarate AND HIV infections.

# ***Emtricitabina, Fumarato de disoproxilo de tenofovir***



## **Fabricantes**

---

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil fumarate  
Gilead Sciences Inc  
333 Lakeside Dr  
Foster City, CA 94404  
(800) 445-3235

Truvada  
Gilead Sciences Inc  
333 Lakeside Dr  
Foster City, CA 94404  
(800) 445-3235

## **Para más información**

---

Comuníquese con su médico o un especialista en información sobre salud de AIDSinfo:

- al teléfono: 1-800-448-0440 De lunes a viernes, de mediodía hasta las 5 p.m., hora del este
- al Live Help: [http://aidsinfo.nih.gov/live\\_help](http://aidsinfo.nih.gov/live_help) De lunes a viernes, de mediodía hasta las 4 p.m., hora del este